

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: klinická a experimentální gastroenterologie

1. Sarkopenie znamená:

- a) snížení množství svalové hmoty
- b) snížení svalové funkce
- c) vyskytuje se asi u poloviny pacientů s jaterní cirhózou na čekací listině k transplantaci
- d) a–c jsou správně

2. Mezi příznaky syndromu křehkosti nepatří:

- a) pokles svalové síly
- b) úbytek svalové hmoty
- c) snížené množství energie
- d) pokles fyzické zdatnosti

3. Časná fáze Crohnovy choroby není definována:

- a) délkou trvání choroby méně než 18 měsíců od diagnózy
- b) absencí předchozí či současné léčby imunomodulátory
- c) absencí předchozí či současné léčby biologiky
- d) absencí předchozí či současné léčby aminosalicyláty

4. Ustekinumab je monoklonální protilátka, pro kterou neplatí:

- a) jedná se o protilátku proti IL-12
- b) jedná se o protilátku proti IL-23

- c) s jednoznačně prokázaným účinkem u časně fáze Crohnovy choroby
- d) jedná se o humánní protilátku typu IgG1

5. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů po transplantaci jater:

- a) je nejvyšší u pacientů s PSC/UC
- b) není nejspíše ovlivněné kouřením
- c) není nejspíše ovlivněné rodinnou anamnézou
- d) je zcela srovnatelné s obecnou populací

6. Kolorektální karcinom po transplantaci jater:

- a) se prakticky nevyskytuje
- b) se vyskytuje mírně častěji než v obecné populaci
- c) se vyskytuje 10krát častěji než v obecné populaci
- d) nemůže být léčen chemoterapií pro podávanou imunosupresi

7. Pro rektokélu platí:

- a) podle lokalizace ji dělíme na ventrální a dorzální
- b) podle lokalizace ji dělíme na laterální a mediální

- c) dorzální se vyklenuje do rektovaginálního prostoru
- d) ventrální se vyklenuje do presakrálního prostoru

8. Mezi vyšetření užívaná k diagnostice poruch pánevního dna nepatří:

- a) anorektální manometrie
- b) anorektální sonografie
- c) defekografie
- d) koloskopie

9. Mezi vyšetřovací metody poruch motility žaludku nepatří:

- a) elektrogastrografie
- b) scintigrafie žaludku
- c) endoFLIP
- d) žaludeční pH-metrie

10. Ketamin podaný v intramuskulární injekci u experimentálního prasete:

- a) ovlivňuje myoelektrickou aktivitu žaludku
- b) neovlivňuje myoelektrickou aktivitu žaludku
- c) může být bez obav používán při studiu gastrointestinální motility u prasat
- d) se u experimentálních prasat v premedikaci nepoužívá