

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: Gastrointestinální onkologie

1. Čím se vyznačuje smíšený adenoneuroendokrinní karcinom:

- a) je určitým podtypem adenokarcinomu žaludku
- b) může se vyskytovat v různých částech gastrointestinálního traktu
- c) neuroendokrinní část nádoru tvoří méně než 20 % léze
- d) tyto nádory mají lepší prognózu v porovnání s adenokarcinomy

2. Jak častá je primární neodpovídavost na terapii intravenózním infliximabem:

- a) 35–40 %
- b) 5–6 %
- c) 10–30 %
- d) 40–45 %

3. Jaký vliv má subkutánně podávaný infliximab na léčbu pacientů s Crohnovou chorobou:

- a) jeho účinné koncentrace mají kolísavý charakter
- b) vyznačuje se nižší imunogenicitou v porovnání s intravenózním infliximabem

- c) má vyšší imunogenicitu v porovnání s intravenózním infliximabem
- d) vede k vyššímu výskytu neutralizačních protilátek

4. Jaké jsou prediktory akcelerované clearance vedolizumabu a ztráty odpovědi na tuto léčbu:

- a) obezita
- b) leukocytóza
- c) endoskopické Mayo score 3
- d) primární neodpovídavost na léčbu anti-TNF

5. Která z uvedených malignit je druhým nejčastějším nádorem v gastrointestinálním traktu:

- a) kolorektální karcinom
- b) karcinom žaludku
- c) adenokarcinom jícnu
- d) karcinom pankreatu

6. Co označuje pojem věkově předčasný kolorektální karcinom (KKR):

- a) výskyt KKR před 60. rokem života
- b) výskyt KKR před 50. rokem života
- c) výskyt KKR před 55. rokem života
- d) výskyt KKR před 18. rokem života

7. Mezi renální projevy IBD metabolického původu patří:

- a) tubulointersticiální nefritida
- b) glomerulonefritida
- c) urolitiáza
- d) amyloidóza ledvin

8. Jaké je nejčastější složení konkrémentů při urolitiáze u pacientů s IBD:

- a) karbonáthydroxylapatit
- b) oxalát vápenatý
- c) soli kyseliny močové
- d) soli citrátů

9. Jaká je v ČR průměrná čekací doba na koloskopii po pozitivním TOKS:

- a) 70 dní
- b) 50 dní
- c) 30 dní
- d) 90 dní

10. Jak velký je podíl pozitivních screeningových TOKS v programu screeningu KRK v ČR:

- a) 5–6 %
- b) 20 %
- c) 10 %
- d) 30 %



AVENIER

ELIMINUJTE DALŠÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA SVÝCH PACIENTŮ

Virová hepatitida způsobuje zánětlivé onemocnění jater a je rozšířena po celém světě. Existuje několik typů hepatitid (A, B, C, D a E). Hepatitida typu A a B je preventabilní očkováním, které patří mezi základní výbavu pro cestování jak zahraničí, tak v tuzemsku.

Léčba virových hepatitid je velmi náročná a nákladná, proto je **očkování** nejlepší dlouhodobou prevencí.

Doporučte svým pacientům návštěvu **očkovacího centra**.

Očkovací centra Avenier

- Odborník v oblasti očkování a cestovní medicíny
- Objednání online na čas a bez čekání
- Hlídání termínů a účinnosti očkování
- Elektronický očkovací průkaz
- Přijímáme platební karty a poukázky



545 123 321

www.ockovacikum.cz

Naleznete nás po celé České republice



S NÁMI MÁTE O STAROST MÉNĚ.

Největší síť očkovacích center v ČR.



Odborník v oblasti očkování
a cestovní medicíny



Objednání online na čas bez čekání



Hlídání termínů a účinnosti očkování



Elektronický očkovací průkaz



Přijímáme platební karty
a poukázky

Naše očkovací
centra najdete po
celé České republice.

Objednejte se ještě dnes:



www.ockovacentrum.cz

545 123 321

